

Insinöörimatematiikka: Lineaarialgebra 2024

Älä käytä tehtävissä tekoälyä vaan omaasi. Laskut tulee suorittaa käsin, ellei toisin mainita.

Demonstraatio 5 12.12.2024

1. Olkoon $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ avaruuden \mathbb{R}^2 kanta, $\mathbf{x} = x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2$, ja $\mathbf{y} = y_1\mathbf{b}_1 + y_2\mathbf{b}_2$ ja (\mathbf{x}, \mathbf{y}) jokin sisätulo.

Sijoita vektoreiden \mathbf{x} ja \mathbf{y} kantaesitykset sisätuloon (\mathbf{x}, \mathbf{y}) ja esitä tämä kanta-vektoreiden sisätulojen $(\mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j)$ avulla.

Vertaa näin saatua lauseketta matriisituloon

$$(x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Mitä voit todeta matriisialkioista M_{ij} ?

2. Sopivalla sijoituksella $x_1 = \alpha x + \beta y$ ja $y_1 = \gamma x + \delta y$ voidaan *neliömuodosta* $ax^2 + bxy + cy^2$ eliminoida ”sekatermi” xy .

Tarkastele tätä varten ensin miltä näyttää

$$(x \ y) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \tag{1}$$

ja kirjoita sen jälkeen

$$3x^2 + 10xy + 3y^2$$

muotoon (1). Etsi sitten kaavassa esiintyvän matriisin ominaisarvot ja -vektorit, similaarinen diagonaalimatriisi ja similarisuuden välittävä matriisi (voi laskea matematiikkaohjelmalla). Miten näistä selviää sijoitus, jossa ”sekatermi” xy häviää?

3. Olkoon $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{(\mathbf{x}, \mathbf{x})}$ sisätulon indusoima normi. Osoita, että tällöin

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = 2\|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{y}\|^2. \tag{2}$$

Selitä miksi yhtälöä (2) kutsutaan *suunnikassäännöksi*.

4. Osoita, että \mathbb{R}^2 :ssa määritelty normi $\|(x, y)\| = |x| + |y|$ ei aina toteuta suunnikassääntöä.
5. Olkoon $\{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$ avaruuden \mathbb{R}^3 kanta (miksi se on kanta?). Onko mahdollista ”julistaa” tämä kanta ortonormaaliksi määrittelemällä sisätulo, jossa $((1, 0, 0), (1, 0, 0)) = 1$, $((1, 0, 0), (1, 1, 0)) = ((1, 0, 0), (1, 1, 1)) = 0$, $((1, 1, 0), (1, 1, 0)) = 1$, $((1, 1, 0), (1, 1, 1)) = 0$ ja $((1, 1, 1), (1, 1, 1)) = 1$? Jos tämä on mahdollista, selvitä mitä on $((3, 2, 1), (2, 2, 1))$.
6. Välillä $[\alpha, \alpha + T]$ määritellyille kompleksiarvoisille tietyt ehdot toteuttaville funktiolle määritellään sisätulo ehdolla

$$(f, g) = \int_{\alpha}^{\alpha+T} f(x)\overline{g(x)} dx.$$

Mikä on funktioiden $e^{\frac{2\pi i n}{T}x}$ ja $e^{\frac{2\pi i m}{T}x}$ etäisyys edellä määritellyn sisätulon indusoiman metriikan suhteen? Vihje: Integrointiin liittyvät laskut on esitetty luennolla ja niihin voi vedota.

7. Totea laskemalla että avaruuden \mathbb{R}^3 vektorijoukko $B = \{(2, 0, -1), (1, -1, 2), (1, 5, 2)\}$ on ortogonaali tavallisen pistetulon suhteen ja etsi vektorille $(4, 3, 11)$ esitys joukon B vektoreiden lineaarikombinaationa.
8. Totea että vektorijoukko $B_1 = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^3$ on lineaarisesti riippumaton. Käytä luennolla esitettyä Gramin-Schmidtin menetelmää ja esitä jokin jokin ortogonaali (tavallisen pistetulon suhteen) vektorijoukko B_2 , joka generoi saman aliavaruuden kuin B_1 . Etsi myös vektorin $(1, 3, -2)$ esitys kannassa B_2 .
9. Olkoot $\mathbf{x} = (2, 3, 7, 1, 2, 8, 9, 2)$ ja $\mathbf{y} = (6, 7, 5, 1, 3, 6, 2, 6)$. Laske matematiikkaohjelmalla (tai muulla tavalla) koordinaattien keskiarvot $\mu_{\mathbf{x}}$ ja $\mu_{\mathbf{y}}$, $\mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mu_{\mathbf{x}}\mathbf{1}$, $\mathbf{y}' = \mathbf{y} - \mu_{\mathbf{y}}\mathbf{1}$ sekä vektoreisen \mathbf{x}' ja \mathbf{y}' välisen kulman kosini. Merkintä $\mathbf{1}$ tarkoittaa vektoria $(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$.