

Insinöörimatematiikka: Differentiaali- ja integraalilaskenta

Mika Hirvensalo
`mikhirve@utu.fi`

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Turun yliopisto

2025

Eksplisiitti, implisiitti- ja parametrimuoto

Eksplisiittimuoto

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

Implisiittimuoto

$$x^2 + y^2 = 1, y \geq 0$$

Parametrimuoto

$$\{(\cos t, \sin t) \mid t \in [0, \pi]\}$$

Eksplisiittimuoto

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2},$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1 - x^2}}(-2x) = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Implisiittimuoto

Yhtälö $x^2 + y^2 = 1$ määrittelee käyrän $\mathbb{R}^2$:ssa. Käyrän osa, jossa $y \geq 0$ määrittelee funktion $[-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. Derivoimalla implisiittisesti saadaan

$$2x + 2yy' = 0,$$

josta

$$y' = -\frac{x}{y}.$$

Parametrimuoto

$$\{(\cos t, \sin t) \mid t \in [0, \pi]\},$$

missä

$$f(\cos t) = \sin t,$$

josta t :n suhteen derivoimalla saadaan

$$f'(\cos t)(-\sin t) = \cos t.$$

Tästä

$$f'(\cos t) = -\frac{\cos t}{\sin t}.$$

Parametrimuoto

Yleisesti

$$f(x(t)) = y(t),$$

josta derivoimalla t :n suhteen saadaan

$$f'(x(t))x'(t) = y'(t)$$

ja siis


$$f'(x(t)) = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

Leibnitzin merkinnöillä voidaan siis kirjoittaa

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

Esimerkki

$$A = \{(t^3 - 2t^2 + 3, t^2 - t + 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$$



Funktio pisteen (2, 1) ympäristössä. $f'(2)$?

Esimerkki

$$x^3 + 2x^2y - 4xy^2 + 3y^4 = 37$$

pisteen $(1, 2)$ ympäristössä.

Merkintöjä

- 2-kertainen derivaatta: $D^2f(x)$, $f''(x)$, $\frac{d^2}{dx^2}f(x)$, $\frac{d^2f(x)}{dx^2}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$
- 3-kertainen derivaatta: $D^3f(x)$, $f'''(x)$, $\frac{d^3}{dx^3}f(x)$, $\frac{d^3f(x)}{dx^3}$, $\frac{d^3y}{dx^3}$
- n -kertainen derivaatta: $D_x^n f(x)$, $f^{(n)}(x)$, $\frac{d^n}{dx^n}f(x)$, $\frac{d^n f(x)}{dx^n}$, $\frac{d^n y}{dx^n}$

Osittaisderivaatat:

- $\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial x} f = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$, $\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} f = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$,
 $\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial y} f = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$, jne.
- $D_x^2 f$, $D_{yx} f$, $D_{xy} f$, $D_y^2 f$ jne.

Esimerkki

- $D \sin x = \cos x$, $D^2 \sin x = -\sin x$, $D^3 \sin x = -\cos x$ ja $D^4 \sin x = \sin x$, $D^5 \sin x = \cos x$, jne.
- $De^x = e^x$, $D^2 e^x = e^x$, $D^3 e^x = e^x$, jne.

Esimerkki

Jos $f(x, y) = x \sin(xy)$, on

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = \sin(xy) + x \cos(xy)y,$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} f(x, y) &= \cos(xy)x + x \cos(xy) - xy \sin(xy)x \\ &= 2x \cos(xy) - x^2 y \sin(xy). \end{aligned}$$

Toisaalta

$$\frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = x^2 \cos(xy)$$

ja

$$\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x, y) = 2x \cos(xy) - x^2 y \sin(xy).$$

Huomautus

Mahdollisesti

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \neq \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

Derivointijärjestyksen voi kuitenkin vaihtaa, jos f on riittävän säännöllinen (toisen kertaluvun osittaisderivaatat jatkuvia).

Antiderivaatta

Määritelmä

Jos $F'(x) = f(x)$, sanotaan, että $F(x)$ on funktion $f(x)$ antiderivaatta (kantafunktio, primitiivifunktio, määräämätön integraali)

Esimerkki

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{n+1} x^{n+1} = \frac{1}{n+1} (n+1) x^n = x^n.$$

Huomautus

Jos $F(x)$ on $f(x)$:n antiderivaatta ja C vakio, on

$$\frac{d}{dx}(F(x) + C) = \frac{d}{dx}F(x) + \frac{d}{dx}C = f(x) + 0 = f(x),$$

joten myös $F(x) + C$ on antiderivaatta.

Määritelmä

Funktion $f(x)$ antiderivaatoista käytetään merkintää

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

ja $f(x)$:ää kutsutaan integrandiksi.

Huomautus

$$\int cf(x) dx = c \int f(x) dx$$

ja

$$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$$

Huomautus

- $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C, \text{ jos } n \neq -1$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$
- $\int \sin x dx = -\cos x + C$
- $\int \cos x dx = \sin x + C$
- $\int e^x dx = e^x + C$