

Insinöörimatematiikka: Matematiikan perustiedot

Mika Hirvensalo
mikhirve@utu.fi

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Turun yliopisto

2025

Trigonometriset funktiot

"Määritelmä"

Ympyräsektorin kulman suuruus on sektorin kaaren pituus jaettuna säteen pituudella. Tällöin kulma x (asteissa) voidaan muuntaa kulmaksi y (radiaaneissa) seuraavasti: $y = \frac{\pi}{180}x$. Suoran kulman suuruus on siis $\frac{\pi}{2}$, oikokulman π ja täyden ympyrän 2π .


"Määritelmä"

Ympyräsektorin kulman suuruus on sektorin kaaren pituus jaettuna säteen pituudella. Tällöin kulma x (asteissa) voidaan muuntaa kulmaksi y (radiaaneissa) seuraavasti: $y = \frac{\pi}{180}x$. Suoran kulman suuruus on siis $\frac{\pi}{2}$, oikokulman π ja täyden ympyrän 2π .


"Määritelmä"

Kulman, joka kiertyy positiiviselta x -akselilta myötäpäivään *kehäpiste* on origokeskisen yksikköympyrän ja kulman vasemman kyljen leikkauspiste. Tämän kulman *sini* on kehäpisteen y -koordinaatti ja *kosini* x -koordinaatti.


Trigonometriset funktiot



Trigonometriset funktiot




$$y = \sin x$$




$$y = \cos x$$

Trigonometriset funktiot



$$y = \sin x$$



$$y = \cos x$$

$$\sin x = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

Jaksollisuus

$$\sin x = \sin(x + 2\pi n) \quad \text{ja} \quad \cos x = \cos(x + 2\pi n), \quad n \in \mathbb{Z}$$

Jaksollisuus

$$\sin x = \sin(x + 2\pi n) \quad \text{ja} \quad \cos x = \cos(x + 2\pi n), \quad n \in \mathbb{Z}$$

Nollakohdat

- $\sin x = 0 \Leftrightarrow x \in \{n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$
- $\cos x = 0 \Leftrightarrow x \in \{\frac{\pi}{2} + n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$

Jaksollisuus

$$\sin x = \sin(x + 2\pi n) \quad \text{ja} \quad \cos x = \cos(x + 2\pi n), \quad n \in \mathbb{Z}$$


Nollakohdat

- $\sin x = 0 \Leftrightarrow x \in \{n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$
- $\cos x = 0 \Leftrightarrow x \in \{\frac{\pi}{2} + n\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$

Trigonometriset kaavat

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- $\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$
- $\sin x = \cos(x - \frac{\pi}{2})$, jne.

Trigonometriset funktiot




$$y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1] \qquad \sin^{-1} : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$


Trigonometriset funktiot

$$\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1] \quad \sin^{-1} : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$



Trigonometriset funktiot

$$\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1] \quad \sin^{-1} : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$



Käänteisfunktiot

- Funktion $f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$, $f(x) = \sin x$ käänteisfunktio on nimeltään *arkussini*, merkitään $\arcsin$ tai $\sin^{-1}$.

Käänteisfunktiot

- Funktion $f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$, $f(x) = \sin x$ käänteisfunktio on nimeltään *arkussini*, merkitään $\arcsin$ tai $\sin^{-1}$.
- Funktion $f : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$, $f(x) = \cos x$ käänteisfunktio on nimeltään *arkuskosini*, merkitään $\arccos$ tai $\cos^{-1}$.

Käänteisfunktiot

- Funktion $f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$, $f(x) = \sin x$ käänteisfunktio on nimeltään *arkussini*, merkitään $\arcsin$ tai $\sin^{-1}$.
- Funktion $f : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$, $f(x) = \cos x$ käänteisfunktio on nimeltään *arkuskosini*, merkitään $\arccos$ tai $\cos^{-1}$.
- Funktion $f : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \tan x$ käänteisfunktio on nimeltään *arkustangentti*, merkitään $\arctan$ tai $\tan^{-1}$.

Lause

- $\sin(-x) = -\sin x$

Lause

- $\sin(-x) = -\sin x$
- $\cos(-x) = \cos x$

Lause

- $\sin(-x) = -\sin x$
- $\cos(-x) = \cos x$
- $\cos(x + \pi) = -\cos x$

Lause

- $\sin(-x) = -\sin x$
- $\cos(-x) = \cos x$
- $\cos(x + \pi) = -\cos x$
- $\sin(x + \pi) = -\sin x$

Lause

- $\sin(-x) = -\sin x$
- $\cos(-x) = \cos x$
- $\cos(x + \pi) = -\cos x$
- $\sin(x + \pi) = -\sin x$
- $|\sin x| \leq |x|$

Lause

- $\sin(-x) = -\sin x$
- $\cos(-x) = \cos x$
- $\cos(x + \pi) = -\cos x$
- $\sin(x + \pi) = -\sin x$
- $|\sin x| \leq |x|$
- $\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}$

Lause

- $\sin(-x) = -\sin x$
- $\cos(-x) = \cos x$
- $\cos(x + \pi) = -\cos x$
- $\sin(x + \pi) = -\sin x$
- $|\sin x| \leq |x|$
- $\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}$

$$|\sin x - \sin y| = \left| 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2} \right|$$

Lause

- $\sin(-x) = -\sin x$
- $\cos(-x) = \cos x$
- $\cos(x + \pi) = -\cos x$
- $\sin(x + \pi) = -\sin x$
- $|\sin x| \leq |x|$
- $\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}$

$$\begin{aligned} |\sin x - \sin y| &= \left| 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{x-y}{2} \right| \cdot 1 \end{aligned}$$

Lause

- $\sin(-x) = -\sin x$
- $\cos(-x) = \cos x$
- $\cos(x + \pi) = -\cos x$
- $\sin(x + \pi) = -\sin x$
- $|\sin x| \leq |x|$
- $\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}$

$$\begin{aligned} |\sin x - \sin y| &= \left| 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{x-y}{2} \right| \cdot 1 \leq 2 \left| \frac{x-y}{2} \right| \end{aligned}$$

Lause

- $\sin(-x) = -\sin x$
- $\cos(-x) = \cos x$
- $\cos(x + \pi) = -\cos x$
- $\sin(x + \pi) = -\sin x$
- $|\sin x| \leq |x|$
- $\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}$

$$\begin{aligned} |\sin x - \sin y| &= \left| 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{x-y}{2} \right| \cdot 1 \leq 2 \left| \frac{x-y}{2} \right| = |x-y| \end{aligned}$$

Lause

- $\sin(-x) = -\sin x$
- $\cos(-x) = \cos x$
- $\cos(x + \pi) = -\cos x$
- $\sin(x + \pi) = -\sin x$
- $|\sin x| \leq |x|$
- $\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}$

$$\begin{aligned} |\sin x - \sin y| &= \left| 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{x-y}{2} \right| \cdot 1 \leq 2 \left| \frac{x-y}{2} \right| = |x-y|, \end{aligned}$$

siis $d(\sin x, \sin y) \leq d(x, y)$.

Lause

- $\sin(-x) = -\sin x$
- $\cos(-x) = \cos x$
- $\cos(x + \pi) = -\cos x$
- $\sin(x + \pi) = -\sin x$
- $|\sin x| \leq |x|$
- $\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}$

$$\begin{aligned} |\sin x - \sin y| &= \left| 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{x-y}{2} \right| \cdot 1 \leq 2 \left| \frac{x-y}{2} \right| = |x-y|, \end{aligned}$$

siis $d(\sin x, \sin y) \leq d(x, y)$. Samoin $d(\cos x, \cos y) \leq d(x, y)$.

Algebralliset funktiot

Kahden muuttujan polynomiyhtälö $P(x, y) = 0$ saattaa määritellä funktion $f : A \rightarrow B$, $y = f(x)$ kunhan joukot A ja B valitaan sopivasti. Tällaisia funktioita sanotaan *algebrallisiksi*. Tällöin siis x on alkukuva ja y on kuva.

Kahden muuttujan polynomiyhtälö $P(x, y) = 0$ saattaa määritellä funktion $f : A \rightarrow B$, $y = f(x)$ kunhan joukot A ja B valitaan sopivasti. Tällaisia funktioita sanotaan *algebrallisiksi*. Tällöin siis x on alkukuva ja y on kuva.

Esimerkki

Polynomiyhtälö $x^2 + y^2 - 1 = 0$ määrittelee yksikköympyrän. Mikäli valitaan $A = [-1, 1]$ ja $B = [0, \infty)$, saadaan aikaan funktio $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$.

Algebralliset funktiot

Kahden muuttujan polynomi yhtälö $P(x, y) = 0$ saattaa määritellä funktion $f : A \rightarrow B$, $y = f(x)$ kunhan joukot A ja B valitaan sopivasti. Tällaisia funktioita sanotaan *algebrallisiksi*. Tällöin siis x on alkukuva ja y on kuva.

Esimerkki

Polynomi yhtälö $x^2 + y^2 - 1 = 0$ määrittelee yksikköympyrän. Mikäli valitaan $A = [-1, 1]$ ja $B = [0, \infty)$, saadaan aikaan funktio $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$.

Esimerkki

Polynomi yhtälö $x^2 - y^2 = 0$ voidaan kirjoittaa muotoon $(x - y)(x + y) = 0$, mikä on yhtäpitävää sen kanssa, että $x = y$ tai $x = -y$.

Algebralliset funktiot

Kahden muuttujan polynomi yhtälö $P(x, y) = 0$ saattaa määritellä funktion $f : A \rightarrow B$, $y = f(x)$ kunhan joukot A ja B valitaan sopivasti. Tällaisia funktioita sanotaan *algebrallisiksi*. Tällöin siis x on alkukuva ja y on kuva.

Esimerkki

Polynomi yhtälö $x^2 + y^2 - 1 = 0$ määrittelee yksikköympyrän. Mikäli valitaan $A = [-1, 1]$ ja $B = [0, \infty)$, saadaan aikaan funktio $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$.

Esimerkki

Polynomi yhtälö $x^2 - y^2 = 0$ voidaan kirjoittaa muotoon $(x - y)(x + y) = 0$, mikä on yhtäpitävää sen kanssa, että $x = y$ tai $x = -y$. Jos nyt valitaan $A = \mathbb{R}$ ja $B = [0, \infty)$, saadaan funktio $f(x) = \sqrt{x^2}$.

Esimerkki

Määritellään

$$|x| = \begin{cases} -x, & \text{jos } x < 0 \\ x, & \text{jos } x \geq 0. \end{cases}$$

Esimerkki

Määritellään

$$|x| = \begin{cases} -x, & \text{jos } x < 0 \\ x, & \text{jos } x \geq 0. \end{cases}$$

Esimerkki

Määritellään *signum*-funktio ehdoilla

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} -1, & \text{jos } x < 0 \\ 0 & \text{jos } x = 0 \\ 1, & \text{jos } x > 0. \end{cases}$$

Rationaaliset operaatiot

- Vakiolla kertominen

Rationaaliset operaatiot

- Vakiolla kertominen
- Yhteen- ja vähennyslasku

Rationaaliset operaatiot

- Vakiolla kertominen
- Yhteen- ja vähennyslasku
- Kerto- ja jakolasku

Rationaaliset operaatiot

- Vakiolla kertominen
- Yhteen- ja vähennyslasku
- Kerto- ja jakolasku

Rationaaliset operaatiot

- Vakiolla kertominen
- Yhteen- ja vähennyslasku
- Kerto- ja jakolasku

Määritelmä

Alkeisfunktioita ovat sekä algebralliset funktiot, että eksponentti- ja logaritmifunktiot, sekä trigonometriset funktiot ja näiden käänteisfunktiot, sekä edellä mainituista yhdistämällä ja rationaalisin operaatioin saadut funktiot.

Esitysmuotoja (yksikköympyrä)

- Implisiittimuoto $x^2 + y^2 = 1, y \geq 0, x \in [-1, 1]$
- Eksplisiittimuoto $y = \sqrt{1 - x^2}$
- Parametrimuoto $\{(\cos t, \sin t) \mid t \in [0, \pi]\}$

Esitysmuotoja (yksikköympyrä)

- Implisiittimuoto $x^2 + y^2 = 1, y \geq 0, x \in [-1, 1]$
- Eksplisiittimuoto $y = \sqrt{1 - x^2}$
- Parametrimuoto $\{(\cos t, \sin t) \mid t \in [0, \pi]\}$

Itseisarvo

- Eksplisiittimuoto: $f(x) = |x| = \sqrt{x^2}$

Esitysmuotoja (yksikköympyrä)

- Implisiittimuoto $x^2 + y^2 = 1, y \geq 0, x \in [-1, 1]$
- Eksplisiittimuoto $y = \sqrt{1 - x^2}$
- Parametrimuoto $\{(\cos t, \sin t) \mid t \in [0, \pi]\}$

Itseisarvo

- Eksplisiittimuoto: $f(x) = |x| = \sqrt{x^2}$
- Implisiittimuoto: $x^2 - y^2 = 0, y \geq 0.$

Esitysmuotoja (yksikköympyrä)

- Implisiittimuoto $x^2 + y^2 = 1, y \geq 0, x \in [-1, 1]$
- Eksplisiittimuoto $y = \sqrt{1 - x^2}$
- Parametrimuoto $\{(\cos t, \sin t) \mid t \in [0, \pi]\}$

Itseisarvo

- Eksplisiittimuoto: $f(x) = |x| = \sqrt{x^2}$
- Implisiittimuoto: $x^2 - y^2 = 0, y \geq 0$.
- Parametrimuoto: $\{(t, \operatorname{sgn}(t)t) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

Johdanto

- Yhtälöllä $x + 2 = 1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{N}$.

Johdanto

- Yhtälöllä $x + 2 = 1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{N}$. Laajennus: $\mathbb{Z}$.

Johdanto

- Yhtälöllä $x + 2 = 1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{N}$. Laajennus: $\mathbb{Z}$.
- Yhtälöllä $2x = 1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{Z}$.

Johdanto

- Yhtälöllä $x + 2 = 1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{N}$. Laajennus: $\mathbb{Z}$.
- Yhtälöllä $2x = 1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{Z}$. Laajennus: $\mathbb{Q}$.

Johdanto

- Yhtälöllä $x + 2 = 1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{N}$. Laajennus: $\mathbb{Z}$.
- Yhtälöllä $2x = 1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{Z}$. Laajennus: $\mathbb{Q}$.
- Yhtälöllä $x^2 = 2$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{Q}$.

Johdanto

- Yhtälöllä $x + 2 = 1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{N}$. Laajennus: $\mathbb{Z}$.
- Yhtälöllä $2x = 1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{Z}$. Laajennus: $\mathbb{Q}$.
- Yhtälöllä $x^2 = 2$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{Q}$. Laajennus: $\mathbb{R}$.

Johdanto

- Yhtälöllä $x + 2 = 1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{N}$. Laajennus: $\mathbb{Z}$.
- Yhtälöllä $2x = 1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{Z}$. Laajennus: $\mathbb{Q}$.
- Yhtälöllä $x^2 = 2$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{Q}$. Laajennus: $\mathbb{R}$.
- Yhtälöllä $x^2 = -1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{R}$.

Johdanto

- Yhtälöllä $x + 2 = 1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{N}$. Laajennus: $\mathbb{Z}$.
- Yhtälöllä $2x = 1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{Z}$. Laajennus: $\mathbb{Q}$.
- Yhtälöllä $x^2 = 2$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{Q}$. Laajennus: $\mathbb{R}$.
- Yhtälöllä $x^2 = -1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{R}$. Laajennus: $\mathbb{C}$.

Johdanto

- Yhtälöllä $x + 2 = 1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{N}$. Laajennus: $\mathbb{Z}$.
- Yhtälöllä $2x = 1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{Z}$. Laajennus: $\mathbb{Q}$.
- Yhtälöllä $x^2 = 2$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{Q}$. Laajennus: $\mathbb{R}$.
- Yhtälöllä $x^2 = -1$ ei ole ratkaisua joukossa $\mathbb{R}$. Laajennus: $\mathbb{C}$.

Esimerkki

Toisen asteen polynomi yhtälön

$$ax^2 + bx + c = 0$$

($a \neq 0$) ratkaiseminen

"Määritelmä"

"Määritelmä"

- Imaginaariyksikkö i toteuttaa yhtälön $i^2 = -1$.

"Määritelmä"

- Imaginaariyksikkö i toteuttaa yhtälön $i^2 = -1$.
- Kompleksiluku z on muotoa $z = x + yi$ oleva lauseke, missä x ja $y \in \mathbb{R}$.

"Määritelmä"

- Imaginaariyksikkö i toteuttaa yhtälön $i^2 = -1$.
- Kompleksiluku z on muotoa $z = x + yi$ oleva lauseke, missä x ja $y \in \mathbb{R}$.
- Kompleksiluvut $z_1 = x_1 + y_1i$ ja $z_2 = x_2 + y_2i$ ovat yhtäsuuret tarkalleen silloin kun $x_1 = x_2$ ja $y_1 = y_2$.

"Määritelmä"

- Imaginaariyksikkö i toteuttaa yhtälön $i^2 = -1$.
- Kompleksiluku z on muotoa $z = x + yi$ oleva lauseke, missä x ja $y \in \mathbb{R}$.
- Kompleksiluvut $z_1 = x_1 + y_1i$ ja $z_2 = x_2 + y_2i$ ovat yhtäsuuret tarkalleen silloin kun $x_1 = x_2$ ja $y_1 = y_2$.
- Jos $y = 0$, on $z = x + yi = x \in \mathbb{R}$.

"Määritelmä"

- Imaginaariyksikkö i toteuttaa yhtälön $i^2 = -1$.
- Kompleksiluku z on muotoa $z = x + yi$ oleva lauseke, missä x ja $y \in \mathbb{R}$.
- Kompleksiluvut $z_1 = x_1 + y_1i$ ja $z_2 = x_2 + y_2i$ ovat yhtäsuuret tarkalleen silloin kun $x_1 = x_2$ ja $y_1 = y_2$.
- Jos $y = 0$, on $z = x + yi = x \in \mathbb{R}$.

Huomautus

$f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(x, y) = x + yi$ on bijektio.

Yhteenlasku ja kertolasku

Yhteenlasku ja kertolasku

- $(x_1 + y_1 i) + (x_2 + y_2 i) = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) i$

Yhteenlasku ja kertolasku

- $(x_1 + y_1 i) + (x_2 + y_2 i) = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)i$
- $(x_1 + y_1 i)(x_2 + y_2 i) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + (x_1 y_2 + y_1 x_2)i.$

Yhteenlasku ja kertolasku

- $(x_1 + y_1 i) + (x_2 + y_2 i) = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)i$
- $(x_1 + y_1 i)(x_2 + y_2 i) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + (x_1 y_2 + y_1 x_2)i$.
- Kompleksiluvut ns. toteuttavat kunta-aksioomat

Yhteenlasku ja kertolasku

- $(x_1 + y_1 i) + (x_2 + y_2 i) = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)i$
- $(x_1 + y_1 i)(x_2 + y_2 i) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + (x_1 y_2 + y_1 x_2)i$.
- Kompleksiluvut ns. toteuttavat kunta-aksioomat

Määritelmä

Kompleksiluvun $z = x + yi$ *reaaliosa* määritellään $\operatorname{Re}(z) = x$ ja *imaginaariosa* $\operatorname{Im}(z) = y$

Yhteenlasku ja kertolasku

- $(x_1 + y_1 i) + (x_2 + y_2 i) = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) i$
- $(x_1 + y_1 i)(x_2 + y_2 i) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + (x_1 y_2 + y_1 x_2) i$.
- Kompleksiluvut ns. toteuttavat kunta-aksioomat

Määritelmä

Kompleksiluvun $z = x + yi$ *reaaliosa* määritellään $\operatorname{Re}(z) = x$ ja *imaginaariosa* $\operatorname{Im}(z) = y$

Liittoluku

Kompleksiluvun $z = x + yi$ liittoluku eli kompleksikonjugaatti on $\bar{z} = x - yi$.

Lause


$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2} \quad \text{ja} \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}.$$


Lause

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2} \quad \text{ja} \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}.$$

Kompleksilukujen osamäärä


$$\begin{aligned} \frac{x_1 + y_1 i}{x_2 + y_2 i} &= \frac{(x_1 + y_1 i)(x_2 - y_2 i)}{(x_2 + y_2 i)(x_2 - y_2 i)} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + x_2 y_1 i - x_1 y_2 i}{x_2^2 + y_2^2} \\ &= \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} i. \end{aligned}$$






Kaksi esitystä


- xy -esitys (tai Re-Im) -esitys: reaaliosa x ja imaginaariosa y



Kaksi esitystä


- xy -esitys (tai Re-Im) -esitys: reaali-osa x ja imaginaari-osa y
- Polaari- eli napakoordinaattiesitys: Etäisyys origosta r ja vaihekulma θ .






Itseisarvo ja vaihekulma

- $r = |z| \stackrel{\text{Määr.}}{=} \sqrt{x^2 + y^2}$




Itseisarvo ja vaihekulma

- $r = |z| \stackrel{\text{Määr.}}{=} \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$




Itseisarvo ja vaihekulma

- $r = |z| \stackrel{\text{Määr.}}{=} \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$
- $\tan \theta = \frac{y}{x}.$




Itseisarvo ja vaihekulma


- $r = |z| \stackrel{\text{Määr.}}{=} \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$
- $\tan \theta = \frac{y}{x}$. Jos $x = 0$, valitaan $\begin{cases} \theta = \frac{\pi}{2}, & \text{kun } y > 0 \\ \theta = -\frac{\pi}{2} & \text{kun } y < 0. \end{cases}$



Itseisarvo ja vaihekulma

- $r = |z| \stackrel{\text{Määr.}}{=} \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$
- $\tan \theta = \frac{y}{x}$. Jos $x = 0$, valitaan $\begin{cases} \theta = \frac{\pi}{2}, & \text{kun } y > 0 \\ \theta = -\frac{\pi}{2} & \text{kun } y < 0. \end{cases}$
- Vaihekulma voidaan valita $\theta = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, & \text{jos } x > 0. \\ \arctan \frac{y}{x} + \pi, & \text{jos } x < 0. \end{cases}$





Polaariesitys I ($r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$)

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

joten

$$z = x + yi = r \cos \theta + ir \sin \theta = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$



Leonhard Euler (1707–1783)

Eulerin kaava

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

($e = 2,718281828459045\dots$ on luonnollisen logaritmin kantaluku)

Eulerin kaava

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

($e = 2,718281828459045 \dots$ on luonnollisen logaritmin kantaluku)

Esimerkki

- $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi$

Eulerin kaava

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

($e = 2,718281828459045\dots$ on luonnollisen logaritmin kantaluku)

Esimerkki

- $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1.$

Eulerin kaava

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

($e = 2,718281828459045\dots$ on luonnollisen logaritmin kantaluku)

Esimerkki

- $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1.$
- $e^{i \cdot n\pi} = \cos(n\pi) + i \sin(n\pi)$

Eulerin kaava

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

($e = 2,718281828459045\dots$ on luonnollisen logaritmin kantaluku)

Esimerkki

- $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1.$
- $e^{i \cdot n\pi} = \cos(n\pi) + i \sin(n\pi) = (-1)^n, n \in \mathbb{Z}$


Eulerin kaava


$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

($e = 2,718281828459045\dots$ on luonnollisen logaritmin kantaluku)

Esimerkki

- $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1.$
- $e^{i \cdot n\pi} = \cos(n\pi) + i \sin(n\pi) = (-1)^n, n \in \mathbb{Z}$
- $e^{2\pi i n} = (-1)^{2n} = 1, n \in \mathbb{Z}.$





Polaariesitys II ($e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta$)

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

joten

$$z = x + yi = r \cos \theta + ir \sin \theta = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}.$$

Huomautus

Jos $\theta \in \mathbb{R}$, on

$$\left| e^{i\theta} \right| = |\cos \theta + i \sin \theta| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$$

ja siis polaariesityksessä $z = re^{i\theta}$ on $r = |z|$.

Huomautus

Jos $\theta \in \mathbb{R}$, on

$$\left| e^{i\theta} \right| = |\cos \theta + i \sin \theta| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$$

ja siis polaariesityksessä $z = re^{i\theta}$ on $r = |z|$.

Huomautus

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta = \cos(\theta + 2\pi n) + i \sin(\theta + 2\pi n) = e^{i(\theta + 2\pi n)}$$

Huomautus

Jos $\theta \in \mathbb{R}$, on

$$\left| e^{i\theta} \right| = |\cos \theta + i \sin \theta| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$$

ja siis polaariesityksessä $z = re^{i\theta}$ on $r = |z|$.

Huomautus

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta = \cos(\theta + 2\pi n) + i \sin(\theta + 2\pi n) = e^{i(\theta + 2\pi n)}$$

Seuraus

$$z = re^{i\theta} = re^{i(\theta + 2\pi n)},$$

siis polaariesitys ei ole koskaan yksikäsitteinen, vaan vaihekulmaan θ voidaan aina lisätä mikä hyvänsä täyden ympyrän monikerta.

Lause

Jos $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$, on $e^{i\theta_1}e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)}$.

Kertolaskun tulkinta

$z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$, $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$, missä $r_1 = |z_1|$ ja $r_2 = |z_2|$. Tällöin

$$z_1 z_2 = r_1 e^{i\theta_1} r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}.$$

Lause

Jos $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$, on $e^{i\theta_1}e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)}$.

Kertolaskun tulkinta

$z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$, $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$, missä $r_1 = |z_1|$ ja $r_2 = |z_2|$. Tällöin

$$z_1 z_2 = r_1 e^{i\theta_1} r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}.$$

"itseisarvot kerrotaan ja vaihekulmat lisätään"

de Moivren Kaava

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

Eulerin kaava $\Rightarrow$ Trigonometrian kaavoja

- Euler: $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

Eulerin kaava $\Rightarrow$ Trigonometrian kaavoja

- Euler: $e^{ix} = \cos x + i \sin x$
- $(e^{ix})^2 = e^{2ix} = \cos 2x + i \sin 2x$

Eulerin kaava $\Rightarrow$ Trigonometrian kaavoja

- Euler: $e^{ix} = \cos x + i \sin x$
- $(e^{ix})^2 = e^{2ix} = \cos 2x + i \sin 2x$
- $(e^{ix})^2 = (\cos x + i \sin x)^2 = \cos^2 x - \sin^2 x + i2 \cos x \sin x$

Eulerin kaava $\Rightarrow$ Trigonometrian kaavoja

- Euler: $e^{ix} = \cos x + i \sin x$
- $(e^{ix})^2 = e^{2ix} = \cos 2x + i \sin 2x$
- $(e^{ix})^2 = (\cos x + i \sin x)^2 = \cos^2 x - \sin^2 x + i2 \cos x \sin x$

Vertaamalla reaali- ja imaginaariosia saadaan
 $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$ ja $\sin 2x = 2 \cos x \sin x$

Kompleksinen eksponenttifunktio

Kompleksiluvulle $z = x + iy$ määritellään Eulerin kaavaa noudattaen

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y).$$

Kompleksinen eksponenttifunktio

Kompleksiluvulle $z = x + iy$ määritellään Eulerin kaavaa noudattaen

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y).$$

Huomautus

Jos $n \in \mathbb{Z}$, on

$$e^{z+2\pi in} = e^z e^{2\pi in} = e^z,$$

eikä eksponenttifunktio $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ siten ole injektio.

Huomautuksia

Huomautuksia

- Funktion $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = e^z$ arvojoukko on $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, eikä f siis ole myöskään surjektio.

Huomautuksia

- Funktion $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = e^z$ arvojoukko on $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, eikä f siis ole myöskään surjektio.
- Käänteisrelaatio $f^{-1} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ei ole funktio: Nollalla ei ole yhtään kuvaa ja kaikilla muilla $z \in \mathbb{C}$ on äärettömän monta kuvaa.

Huomautuksia

- Funktion $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = e^z$ arvojoukko on $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, eikä f siis ole myöskään surjektio.
- Käänteisrelaatio $f^{-1} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ei ole funktio: Nollalla ei ole yhtään kuvaa ja kaikilla muilla $z \in \mathbb{C}$ on äärettömän monta kuvaa.
- Funktio $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $f(z) = e^z$ on surjektio mutta ei injektio.

Huomautuksia

- Funktion $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = e^z$ arvojoukko on $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, eikä f siis ole myöskään surjektio.
- Käänteisrelaatio $f^{-1} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ei ole funktio: Nollalla ei ole yhtään kuvaa ja kaikilla muilla $z \in \mathbb{C}$ on äärettömän monta kuvaa.
- Funktio $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $f(z) = e^z$ on surjektio mutta ei injektio. Määritellään kompleksinen logaritmi tämän funktion käänteisrelaationa.

Huomautuksia

- Funktion $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = e^z$ arvojoukko on $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, eikä f siis ole myöskään surjektio.
- Käänteisrelaatio $f^{-1} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ei ole funktio: Nollalla ei ole yhtään kuvaa ja kaikilla muilla $z \in \mathbb{C}$ on äärettömän monta kuvaa.
- Funktio $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $f(z) = e^z$ on surjektio mutta ei injektio. Määritellään kompleksinen logaritmi tämän funktion käänteisrelaationa.
- Analogia: Jos $r \in \mathbb{R}_+$, $\theta \in \mathbb{R}$ ja $x = re^{\theta}$, niin $\ln x = \ln(re^{\theta}) = \ln r + \ln e^{\theta} = \ln r + \theta$.

Kompleksinen logaritmi

Kompleksiluvun $z \neq 0$ logaritmi saadaan polaariesityksen avulla: Olkoon z :n polaariesitys $z = |z| e^{i\theta} = |z| e^{i(\theta+2\pi n)}$. Tällöin kompleksinen logaritmi määritellään

$$\operatorname{Log} z = \ln |z| + i(\theta + 2\pi n),$$

missä $n \in \mathbb{Z}$.

Kompleksinen logaritmi

Kompleksiluvun $z \neq 0$ logaritmi saadaan polaariesityksen avulla: Olkoon z :n polaariesitys $z = |z| e^{i\theta} = |z| e^{i(\theta+2\pi n)}$. Tällöin kompleksinen logaritmi määritellään

$$\operatorname{Log} z = \ln |z| + i(\theta + 2\pi n),$$

missä $n \in \mathbb{Z}$.

Huomautus

$\operatorname{Log} : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}$ tarkoittaa kompleksista e -kantaista logaritmia, $\ln : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ tavallista reaaliluvuilla määriteltyä e -kantaista logaritmia.

Määritelmä

$$\operatorname{Log} z = \ln |z| + i(\theta + 2\pi n), \quad n \in \mathbb{Z}$$

Määritelmä

$$\operatorname{Log} z = \ln |z| + i(\theta + 2\pi n), \quad n \in \mathbb{Z}$$

Määritelmän ongelmia

- Määritelmän oikea puoli on ääretön joukko kompleksilukuja. Joskus käytetään joukkosulkeita.

Määritelmä

$$\operatorname{Log} z = \ln |z| + i(\theta + 2\pi n), \quad n \in \mathbb{Z}$$

Määritelmän ongelmia

- Määritelmän oikea puoli on ääretön joukko kompleksilukuja. Joskus käytetään joukkosulkeita.
- Oikea määritelmä: Kaikille $n \in \mathbb{Z}$ ns. relaationuoli

$$z \xrightarrow{\operatorname{Log}} \ln |z| + i(\theta + 2\pi n).$$

Määritelmä

$$\operatorname{Log} z = \ln |z| + i(\theta + 2\pi n), \quad n \in \mathbb{Z}$$

Määritelmän ongelmia

- Määritelmän oikea puoli on ääretön joukko kompleksilukuja. Joskus käytetään joukkosulkeita.
- Oikea määritelmä: Kaikille $n \in \mathbb{Z}$ ns. relaationuoli

$$z \xrightarrow{\operatorname{Log}} \ln |z| + i(\theta + 2\pi n).$$

- Kurssille valittu määritelmä tasapainotettu perinteen ja johdonmukaisuuden välillä.

Tulkintamahdollisuuksia

- Käsitetään logaritmi funktiona $\text{Log} : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow 2^{\mathbb{C}}$. Joukko $\{z\}$ ja luku z samaistetaan. Voidaan käyttää tällä kurssilla.

Tulkintamahdollisuuksia

- Käsitetään logaritmi funktiona $\text{Log} : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow 2^{\mathbb{C}}$. Joukko $\{z\}$ ja luku z samaistetaan. Voidaan käyttää tällä kurssilla.
- Logaritmin maalijoukon laajentaminen, jolloin saadaan funktio. Edellyttää kompleksitason "monistamista" äärettömän moneksi kopioksi ja niiden sopivaa yhteenliittämistä (ns. Riemannin pinnat). Ei käsitellä tällä kurssilla.

Tulkintamahdollisuuksia

- Käsitetään logaritmi funktiona $\text{Log} : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow 2^{\mathbb{C}}$. Joukko $\{z\}$ ja luku z samaistetaan. Voidaan käyttää tällä kurssilla.
- Logaritmin maalijoukon laajentaminen, jolloin saadaan funktio. Edellyttää kompleksitason "monistamista" äärettömän moneksi kopioksi ja niiden sopivaa yhteenliittämistä (ns. Riemannin pinnat). Ei käsitellä tällä kurssilla.
- Vaihekulman rajoittaminen yksikäsitteisyyden saavuttamiseksi (ns. päähaara). Voidaan käyttää tällä kurssilla.

Esimerkki

- $\text{Log}(-2)$?

Esimerkki

- $\text{Log}(-2)$?
- Luvun -2 polaariesitys ?

Esimerkki

- $\text{Log}(-2)$?
- Luvun -2 polaariesitys ?
- $|-2| = 2$, vaihekulma π

Esimerkki

- $\text{Log}(-2)$?
- Luvun -2 polaariesitys ?
- $|-2| = 2$, vaihekulma π
- $-2 = 2 \cdot e^{i\pi} = 2e^{i(\pi+2\pi n)}$, missä $n \in \mathbb{Z}$

Esimerkki

- $\text{Log}(-2)$?
- Luvun -2 polaariesitys ?
- $|-2| = 2$, vaihekulma π
- $-2 = 2 \cdot e^{i\pi} = 2e^{i(\pi+2\pi n)}$, missä $n \in \mathbb{Z}$
- $\text{Log}(-2) = \ln 2 + i(\pi + 2\pi n)$, missä $n \in \mathbb{Z}$

Esimerkki

- $\text{Log } i$?

Esimerkki

- $\text{Log } i$?
- Luvun i polaariesitys ?

Esimerkki

- $\text{Log } i$?
- Luvun i polaariesitys ?
- $|i| = 1$, vaihekulma $\frac{\pi}{2}$

Esimerkki

- $\text{Log } i$?
- Luvun i polaariesitys ?
- $|i| = 1$, vaihekulma $\frac{\pi}{2}$
- $i = 1 \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} = e^{i(\frac{\pi}{2} + 2\pi n)}$, missä $n \in \mathbb{Z}$

Esimerkki

- $\text{Log } i$?
- Luvun i polaariesitys ?
- $|i| = 1$, vaihekulma $\frac{\pi}{2}$
- $i = 1 \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} = e^{i(\frac{\pi}{2} + 2\pi n)}$, missä $n \in \mathbb{Z}$
- $\text{Log } i = i(\frac{\pi}{2} + 2\pi n)$, missä $n \in \mathbb{Z}$

Logaritmin päähaara

Logaritmin *päähaara* $\overline{\text{Log}}$ on logaritmirelaation

$$z \xrightarrow{\text{Log}} \ln |z| + i(\theta + n \cdot 2\pi)$$

se kuva

$$\overline{\text{Log}} z = \ln |z| + i(\theta + 2n_1\pi),$$

jolle pätee $\theta + 2n_1\pi \in (-\pi, \pi]$.

Logaritmin päähaara

Logaritmin *päähaara* $\overline{\text{Log}}$ on logaritmirelaation

$$z \xrightarrow{\text{Log}} \ln |z| + i(\theta + n \cdot 2\pi)$$

se kuva

$$\overline{\text{Log}} z = \ln |z| + i(\theta + 2n_1\pi),$$

jolle pätee $\theta + 2n_1\pi \in (-\pi, \pi]$.

Esimerkki

$$\text{Log}(-2) = \ln 2 + i(\pi + 2\pi n),$$

Logaritmin päähaara

Logaritmin *päähaara* $\overline{\text{Log}}$ on logaritmirelaation

$$z \xrightarrow{\text{Log}} \ln |z| + i(\theta + n \cdot 2\pi)$$

se kuva

$$\overline{\text{Log}} z = \ln |z| + i(\theta + 2n_1\pi),$$

jolle pätee $\theta + 2n_1\pi \in (-\pi, \pi]$.

Esimerkki

$$\text{Log}(-2) = \ln 2 + i(\pi + 2\pi n),$$

$$\overline{\text{Log}}(-2) = \ln 2 + i\pi$$

Analogia reaaliluvuilla

$$a^b = e^{\ln a^b} = e^{b \ln a}$$

Analogia reaaliluvuilla

$$a^b = e^{\ln a^b} = e^{b \ln a}$$

Määritelmä

Olkoon $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ja $b \in \mathbb{C}$. Tällöin

$$a^b = e^{b \operatorname{Log} a}$$

Analogia reaaliluvuilla

$$a^b = e^{\ln a^b} = e^{b \ln a}$$

Määritelmä

Olkoon $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ja $b \in \mathbb{C}$. Tällöin

$$a^b = e^{b \operatorname{Log} a}$$

Huomautus

- Koska $\operatorname{Log} : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}$ on relaatio, on myös kompleksinen potenssi relaatio, ts. a^b :llä voi olla useita arvoja.

Analogia reaalityyveilla

$$a^b = e^{\ln a^b} = e^{b \ln a}$$

Määritelmä

Olkoon $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ja $b \in \mathbb{C}$. Tällöin

$$a^b = e^{b \operatorname{Log} a}$$

Huomautus

- Koska $\operatorname{Log} : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}$ on relaatio, on myös kompleksinen potenssi relaatio, ts. a^b :llä voi olla useita arvoja.
- Myös yksikäsitteinen arvo a^b on mahdollista, sillä eksponenttifunktio voi yhdistää monia arvoja yhdeksi.

Esimerkki

- i^i ?

Esimerkki

- i^i ?
- $i^i = e^{\text{Log } i^i} = e^{i \text{Log } i}$

Esimerkki

- i^i ?
- $i^i = e^{\operatorname{Log} i^i} = e^{i \operatorname{Log} i}$
- $\operatorname{Log} i = i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right)$, missä $n \in \mathbb{Z}$

Esimerkki

- i^i ?
- $i^i = e^{\operatorname{Log} i^i} = e^{i \operatorname{Log} i}$
- $\operatorname{Log} i = i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right)$, missä $n \in \mathbb{Z}$
- $i \operatorname{Log} i = -\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right)$, missä $n \in \mathbb{Z}$

Esimerkki

- i^i ?
- $i^i = e^{\operatorname{Log} i^i} = e^{i \operatorname{Log} i}$
- $\operatorname{Log} i = i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right)$, missä $n \in \mathbb{Z}$
- $i \operatorname{Log} i = -\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right)$, missä $n \in \mathbb{Z}$
- $i^i = e^{-\frac{\pi}{2} - 2\pi n} = e^{-\frac{\pi}{2} + 2\pi n}$, missä $n \in \mathbb{Z}$

Esimerkki

- 3^2 ?

Esimerkki

- 3^2 ?
- $3^2 = e^{\text{Log } 3^2} = e^{2 \text{Log } 3}$

Esimerkki

- 3^2 ?
- $3^2 = e^{\operatorname{Log} 3^2} = e^{2 \operatorname{Log} 3}$
- $\operatorname{Log} 3 = \operatorname{Log} 3e^{2\pi in} = \ln 3 + 2\pi in$, missä $n \in \mathbb{Z}$

Esimerkki

- 3^2 ?
- $3^2 = e^{\operatorname{Log} 3^2} = e^{2 \operatorname{Log} 3}$
- $\operatorname{Log} 3 = \operatorname{Log} 3e^{2\pi in} = \ln 3 + 2\pi in$, missä $n \in \mathbb{Z}$
- $2 \operatorname{Log} 3 = 2 \ln 3 + 4\pi in$, missä $n \in \mathbb{Z}$

Esimerkki

- 3^2 ?
- $3^2 = e^{\operatorname{Log} 3^2} = e^{2 \operatorname{Log} 3}$
- $\operatorname{Log} 3 = \operatorname{Log} 3e^{2\pi in} = \ln 3 + 2\pi in$, missä $n \in \mathbb{Z}$
- $2 \operatorname{Log} 3 = 2 \ln 3 + 4\pi in$, missä $n \in \mathbb{Z}$
- $3^2 = e^{2 \ln 3 + 4\pi in} = e^{2 \ln 3} e^{4\pi in} = e^{2 \ln 3} = e^{\ln 9} = 9$

Esimerkki

- $8^{\frac{1}{3}}$?

Esimerkki

- $8^{\frac{1}{3}}$?
- $8^{\frac{1}{3}} = e^{\text{Log } 8^{\frac{1}{3}}} = e^{\frac{1}{3} \text{Log } 8}$

Esimerkki

- $8^{\frac{1}{3}}$?
- $8^{\frac{1}{3}} = e^{\operatorname{Log} 8^{\frac{1}{3}}} = e^{\frac{1}{3} \operatorname{Log} 8}$
- $\operatorname{Log} 8 = \operatorname{Log} 8e^{2\pi in} = \ln 8 + 2\pi in$, missä $n \in \mathbb{Z}$

Esimerkki

- $8^{\frac{1}{3}}$?
- $8^{\frac{1}{3}} = e^{\operatorname{Log} 8^{\frac{1}{3}}} = e^{\frac{1}{3} \operatorname{Log} 8}$
- $\operatorname{Log} 8 = \operatorname{Log} 8e^{2\pi in} = \ln 8 + 2\pi in$, missä $n \in \mathbb{Z}$
- $\frac{1}{3} \operatorname{Log} 8 = \frac{1}{3} \ln 8 + \frac{2\pi in}{3}$, missä $n \in \mathbb{Z}$

Esimerkki

- $8^{\frac{1}{3}}$?
- $8^{\frac{1}{3}} = e^{\operatorname{Log} 8^{\frac{1}{3}}} = e^{\frac{1}{3} \operatorname{Log} 8}$
- $\operatorname{Log} 8 = \operatorname{Log} 8e^{2\pi in} = \ln 8 + 2\pi in$, missä $n \in \mathbb{Z}$
- $\frac{1}{3} \operatorname{Log} 8 = \frac{1}{3} \ln 8 + \frac{2\pi in}{3}$, missä $n \in \mathbb{Z}$
- $8^{\frac{1}{3}} = e^{\frac{1}{3} \ln 8 + \frac{2\pi in}{3}} = e^{\ln 8^{\frac{1}{3}}} e^{\frac{2\pi in}{3}} = 2e^{\frac{2\pi in}{3}}$, missä $n \in \mathbb{Z}$

Esimerkki

- $8^{\frac{1}{3}}$?
- $8^{\frac{1}{3}} = e^{\operatorname{Log} 8^{\frac{1}{3}}} = e^{\frac{1}{3} \operatorname{Log} 8}$
- $\operatorname{Log} 8 = \operatorname{Log} 8e^{2\pi in} = \ln 8 + 2\pi in$, missä $n \in \mathbb{Z}$
- $\frac{1}{3} \operatorname{Log} 8 = \frac{1}{3} \ln 8 + \frac{2\pi in}{3}$, missä $n \in \mathbb{Z}$
- $8^{\frac{1}{3}} = e^{\frac{1}{3} \ln 8 + \frac{2\pi in}{3}} = e^{\ln 8^{\frac{1}{3}}} e^{\frac{2\pi in}{3}} = 2e^{\frac{2\pi in}{3}}$, missä $n \in \mathbb{Z}$
- $8^{\frac{1}{3}} = \{2, 2e^{\frac{2\pi in}{3}}, 2e^{\frac{4\pi in}{3}}\}$

Lause (Potenssin arvojen määrät)

Lause (Potenssin arvojen määrät)

- Jos $b \in \mathbb{N}$, kompleksinen potenssi a^b on yksikäsitteinen ja yhtyy kertolaskun avulla saatuun määritelmään:

$$a^b = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{b \text{ kpl}}.$$

Yksikäsitteisyys on myös voimassa kaikille $b \in \mathbb{Z}$.

Lause (Potenssin arvojen määrät)

- Jos $b \in \mathbb{N}$, kompleksinen potenssi a^b on yksikäsitteinen ja yhtyy kertolaskun avulla saatuun määritelmään:

$$a^b = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{b \text{ kpl}}.$$

Yksikäsitteisyys on myös voimassa kaikille $b \in \mathbb{Z}$.

- Jos $b = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ on supistetussa muodossa, on kompleksisella potenssilla a^b q eri arvoa, jotka saadaan yhdestä arvosta kertomalla luvuilla $e^{\frac{n \cdot 2\pi i}{q}}$, $n \in \{0, 1, \dots, q-1\}$.

Lause (Potenssin arvojen määrät)

- Jos $b \in \mathbb{N}$, kompleksinen potenssi a^b on yksikäsitteinen ja yhtyy kertolaskun avulla saatuun määritelmään:

$$a^b = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{b \text{ kpl}}.$$

Yksikäsitteisyys on myös voimassa kaikille $b \in \mathbb{Z}$.

- Jos $b = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ on supistetussa muodossa, on kompleksisella potenssilla a^b q eri arvoa, jotka saadaan yhdestä arvosta kertomalla luvuilla $e^{\frac{n \cdot 2\pi i}{q}}$, $n \in \{0, 1, \dots, q-1\}$.
- Jos $b \notin \mathbb{Q}$, on kompleksisella potenssilla a^b äärettömän monta eri arvoa, jotka saadaan yhdestä arvosta kertomalla luvuilla $e^{b \cdot n \cdot 2\pi i}$, $n \in \mathbb{Z}$.

Määritelmä

Potenssin a^b pääarvo (tai päähaaran arvo) on $e^{b\overline{\text{Log}} a}$.

Määritelmä

n :nnet ykkösenjuuret ovat potenssin $1^{\frac{1}{n}}$ kaikki arvot

$$1^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n} \operatorname{Log} 1} = e^{\frac{1}{n} \operatorname{Log} e^{2\pi i k}} = e^{\frac{2\pi i k}{n}},$$

missä $k \in \mathbb{Z}$. Nämä ovat yhtälön $z^n = 1$ ratkaisut.

Ykkösenjuuret

Koska $e^{2\pi i} = 1$, on

$$1^{\frac{1}{n}} = \{e^{0 \cdot \frac{2\pi i}{n}} = 1, e^{1 \cdot \frac{2\pi i}{n}}, e^{2 \cdot \frac{2\pi i}{n}}, \dots, e^{(n-1) \cdot \frac{2\pi i}{n}}\}.$$

Ykkösenjuuret

Koska $e^{2\pi i} = 1$, on

$$1^{\frac{1}{n}} = \{e^{0 \cdot \frac{2\pi i}{n}} = 1, e^{1 \cdot \frac{2\pi i}{n}}, e^{2 \cdot \frac{2\pi i}{n}}, \dots, e^{(n-1) \cdot \frac{2\pi i}{n}}\}.$$


Toisin ilmaistuna:

n :nsien ykkösenjuurten itseisarvo on 1 ja vaihekulmat ovat

$$0 \cdot \frac{2\pi}{n}, 1 \cdot \frac{2\pi}{n}, 2 \cdot \frac{2\pi}{n}, \dots, (n-1) \frac{2\pi}{n}.$$

$\frac{2\pi}{n}$ on n :s osa täydestä ympyrästä.

Kompleksinen potenssiinkorotus: $z^8 = 1$ ratkaisut



Eulerin kaava

- $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

Eulerin kaava

- $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$
- $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$

Yhteenlasku ja vähennyslasku tuottaa seuraavat määritelmät:

Eulerin kaava

- $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$
- $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$

Yhteenlasku ja vähennyslasku tuottaa seuraavat määritelmät:

Sini ja kosini

- $\cos z = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz})$
- $\sin z = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz})$

Eulerin kaava

- $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$
- $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$

Yhteenlasku ja vähennyslasku tuottaa seuraavat määritelmät:

Sini ja kosini

- $\cos z = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz})$
- $\sin z = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz})$
- Näin määritellen Eulerin kaava pätee myös kompleksiluvuille

Lukujoukon laajennus

- Yhtälöllä $x^2 + 1 = 0$ ei ole ratkaisua $\mathbb{R}$:ssä, mutta $\mathbb{C}$:ssä kaksi ratkaisua $\pm i$.

Lukujoukon laajennus

- Yhtälöllä $x^2 + 1 = 0$ ei ole ratkaisua $\mathbb{R}$:ssä, mutta $\mathbb{C}$:ssä kaksi ratkaisua $\pm i$.
- Esimerkki: Yhtälöllä $x^2 - 2x + 5 = 0$ on kaksi kompleksista ratkaisua $1 \pm 2i$.

Lukujoukon laajennus

- Yhtälöllä $x^2 + 1 = 0$ ei ole ratkaisua $\mathbb{R}$:ssä, mutta $\mathbb{C}$:ssä kaksi ratkaisua $\pm i$.
- Esimerkki: Yhtälöllä $x^2 - 2x + 5 = 0$ on kaksi kompleksista ratkaisua $1 \pm 2i$.
- Entä kaikki muut polynomiyhtälöt
$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0?$$

Lukujoukon laajennus

- Yhtälöllä $x^2 + 1 = 0$ ei ole ratkaisua $\mathbb{R}$:ssä, mutta $\mathbb{C}$:ssä kaksi ratkaisua $\pm i$.
- Esimerkki: Yhtälöllä $x^2 - 2x + 5 = 0$ on kaksi kompleksista ratkaisua $1 \pm 2i$.
- Entä kaikki muut polynomiyhtälöt
$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0?$$

Määritelmä

Muuttujan z kompleksikertoimisten polynomien joukosta käytetään merkintää $\mathbb{C}[z]$. Vastaavat merkinnät reaali- ja kokonaislukukertoimisista polynomeista ovat $\mathbb{R}[z]$ ja $\mathbb{Z}[x]$.

Algebran peruslause

Olkoon $P(z) = c_n z^n + c_{n-1} z^{n-1} + \dots + c_1 z + c_0 \in \mathbb{C}[z]$. Jos $P(z)$ ei ole vakiopolynomi $c_0 \neq 0$, on polynomiyhtälöllä

$$P(z) = 0$$

ratkaisu joukossa $\mathbb{C}$.

Algebran peruslause

Olkoon $P(z) = c_n z^n + c_{n-1} z^{n-1} + \dots + c_1 z + c_0 \in \mathbb{C}[z]$. Jos $P(z)$ ei ole vakiopolynomi $c_0 \neq 0$, on polynomiyhtälöllä

$$P(z) = 0$$

ratkaisu joukossa $\mathbb{C}$.

Huomautus

Algebran peruslauseesta ei kuitenkaan seuraa että polynomin nollakohta voitaisiin löytää helposti polynomin kertoimista, kuten esim. 2. asteen tapauksessa.

Niels Henrik Abel 1824:

Astetta ≥ 5 olevien polynomien nollakohtia ei yleisesti voida esittää polynomin kertoimista rakennettuna juuri- ja rationaalifunktioiden yhdistelmänä.

Niels Henrik Abel 1824:

Astetta ≥ 5 olevien polynomien nollakohtia ei yleisesti voida esittää polynomin kertoimista rakennettuna juuri- ja rationaalifunktioiden yhdistelmänä.

Toisin sanoen: Ei ole olemassa juuri- ja rationaalifunktioihin perustuvaa "ratkaisukaavaa" jos polynomin aste on ≥ 5 .